



CIERTOS MEDICAMENTOS PUEDEN NECESITAR SER SUSPENDIDOS ANTES DE LA CIRUGÍA

Estas recomendaciones son pautas generales, y el momento específico para suspender estos medicamentos puede variar según los factores de riesgo individuales de cada paciente, el tipo de cirugía y la orientación del médico que los prescribe. **Siempre coordine con su equipo de salud para determinar el mejor enfoque.**

| <i>Tipo de Medicamento</i> | <i>Nombre del Medicamento</i> | <i>Tiempo de Suspensión Antes de la Cirugía</i> |
|--|---|---|
| Anticoagulantes (Diluyentes de la Sangre) | Aspirina (Ácido Acetilsalicílico) | 7 días |
| | Clopidogrel (Plavix) | 5-7 días |
| | Warfarina (Coumadin) | 5 días |
| | Dabigatrán (Pradaxa) | 2-3 días |
| | Rivaroxabán (Xarelto) | 2-3 días |
| | Apixabán (Eliquis) | 2-3 días |
| | Edoxabán (Savaysa) | 2-3 días |
| | Ticagrelor (Brilinta) | 5 días |
| | Prasugrel (Effient) | 7 días |
| Enoxaparina (Lovenox) | 24 horas | |
| AINes (Anti-inflamatorios No Esteroides) | Ibuprofeno (Advil, Motrin) | 5 días |
| | Naproxeno (Aleve, Naprosyn) | 5 días |
| | Diclofenaco (Voltaren) | 2 días |
| | Celecoxib (Celebrex) | 2 días |
| | Meloxicam (Mobic) | 5 días |
| Agonistas del Receptor GLP-1 (Medicamentos para Diabetes y Pérdida de Peso) | Exenatida (Byetta, Bydureon) | 24 horas |
| | Liraglutida (Victoza, Saxenda) | 24 horas |
| | Dulaglutida (Trulicity) | 24 horas |
| | Semaglutida (Ozempic, Wegovy, Rybelsus) | 7 días |
| | Tirzepatida (Mounjaro, Zepbound) | 7 días |
| | Lixisenatida (Adlyxin) | 24 horas |
| Inhibidores de SGLT2 (Diabetes) | Empagliflozina (Jardiance) | 3 días |
| | Canagliflozina (Invokana) | 3 días |
| | Dapagliflozina (Farxiga) | 3 días |
| | Ertugliflozina (Steglatro) | 3 días |